

Dato Médico de Urgencia

55751

Ingreso 16/03/2025

Hora Ingreso 11:20

Fecha Egreso

Hora Egreso

Paciente NAVARRETE PIZARRO AMANDA AGUSTINA

Edad 7 años 6 meses

Rut 25.881.066-K

Dirección BERNARDA MORIN 1080 - Temuco

F. Nacimiento 22/08/2017

Previsión FONDO NACIONAL DE SALUD

Nota

Fono 982283867

ANTECEDENTES

MÉDICOS Sin mórbidos

Peso :26 Kg.

Estatura :0 cms.

Tipo Consulta

Gravedad

Categorización ESI4

Destino Domicilio

SIGNOS VITALES / OTROS DATOS

EVA

Hora	Sistólica	Diastólica	Media	Pulso	Saturación	Temperatura	Frec.Resp.
11:27	0			118	100	36.9 ° Axilar	

0

ANAMNESIS

AM: Hipertrofia amigdalina, TEA

Cx: --

Al: Amoxicilina

Paciente traída por su madre consulta por cuadro de 3 días de evolución con rinorrea, tos seca, odinofagia, fiebre de hasta 38.5°C, desde ayer con dolor abdominal sin náuseas, vómitos o deposiciones líquidas.

Madre refiere que desde que inicio el cuadro esta con Ibuprofeno en jarabe 6 ml c/8 hrs y ayer inicio Oxolamina en jarabe.

EXAMEN FÍSICO

Pcte ingresa caminando en BCG, afebril, eupneica, mucosas hidratadas normocoloreadas

Cardiopulmonar RR2T NAS, MP (+) SRA

Abdomen plano blando, depresible, dolor a la palpación en epigastrio, umbilical e hipogastrio. RH (+) aumentados. Sin signos de irritación peritoneal, Blumberg (-). Mc Burney (-).

ORL: Faringe con amígdalas hipertrofiadas eritematosas sin placas de pus, sin descarga posterior. Adenopatías cervicales bilaterales de carácter inflamatorio.

TRATAMIENTO

EXÁMENES

PROCEDIMIENTOS

Sin indicaciones en box.

Indicaciones al alta

- Reposo en casa por esta semana
- Hidratación abundante, preferir líquidos fríos
- Paracetamol 160 mg, 2 comprimidos cada 8 horas por 3 días vía oral (Intercalar con ibuprofeno)
- Ibuprofeno forte jarabe 200mg/5ml, 6.5 ml c/8 hrs x 2 días (Intercalar con paracetamol)
- Levocetirizina jarabe 5mg/5 ml, 5 ml c/24 hrs x 5 días
- Control con signos de alarma

INDICACIONES

- 1) Paracetamol 160 mg, 2 comprimidos cada 8 horas por 3 días vía oral (Intercalar con ibuprofeno)
- 2) Ibuprofeno forte jarabe 200mg/5ml, 6.5 ml c/8 hrs x 2 días (Intercalar con paracetamol)
- 3) Levocetirizina jarabe 5mg/5 ml, 5 ml c/24 hrs x 5 días

Diagnóstico RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)

Presuntivo