



EPICRISIS CLÍNICA

Paciente	: MONSERRAT ANTONIA LEON AINOL	Nombre Social	: N.A
Rut	: 24140920-1	Grupo Sangre	: N.A
Previsión	: FONASA - D	Fecha Admisión	: 20/04/2025 03:51
F. Nacimiento	: 13/12/2012 (12 años 4 meses 2 semanas)	Servicio Previo	: EMERGENCIA PEDIATRICA
Sexo/Género	: FEMENINO	Servicio Actual	: CIRUGIA INFANTIL CUIDADOS MEDIOS
Teléfono	: 40511942	Ingreso Servicio	: 20/04/2025 04:11
Dirección	: AVENIDA BARROS ARANA 205 ED.LAUTARO DPTO.511 0, TEMUCO (##)		
Fecha Epicrisis	: 27/04/2025		

DIAGNOSTICOS DE EGRESO

Diagnósticos Activos

- [Reg. 20/04/2025] - PERITONITIS DIFUSA

RESUMEN CLÍNICO PARA EPICRISIS

Diagnósticos de ingreso:

- Apendicitis aguda

Historia Clínica:

Paciente con cuadro de 3 días de evolución de dolor abdominal difuso con predominio en FID. Consulta en 1era instancia en Lautaro, donde se maneja cuadro de manera sintomática. Durante la tarde, dado persistencia de síntomas, consulta en RedSalud, donde se realizan exámenes de laboratorio en los cuales destaca elevación de parámetros inflamatorios (PCR: 121 y Leucos: 18130) y se solicita TAC AP con hallazgos compatibles con apendicitis aguda de hasta 14mm, con signos de perforación, sin signos de colecciones.

Ingresa a SUI la madrugada del 20/04/25. Ingrera febril hasta 39.3°C y taquicardia hasta 172x. Al examen físico destaca dolor a la palpación abdominal, mayor en FID y asociado a resistencia muscular localizada. Blumberg (+). Se confirma diagnóstico, se inicia terapia antibiótica EV y se prepara para pabellón.

El 20/04/25 se realiza laparoscopía exploratoria, donde se evidencian peritonitis difusa con apéndice necrótico y perforada. Completo 7 días tratamiento antibiótico triassociado. Afebril, estable hemodinámicamente. Si dolor. Alimentándose bien, sin vómitos, transito intestinal normal.

Dado su buena evolución y tratamiento antibiótico EV completado, paciente en condiciones de alta a domicilio.

Diagnósticos de Egreso:

- Peritonitis difusa de origen apendicular operada

DETALLE INTERVENCIÓN

20/04/25: Laparoscopía exploradora: Aseoperitoneal + apendicectomía.

ALTA

INDICACIONES

- Regimen liviano
- Reposo relativo 1 semana en domicilio
- Reposo deportivo por 1 mes
- Paracetamol 500mg 2 comprimidos vía oral en caso de dolor (Máximo 2 cada 8 horas)
- Control en polyclínico de cirugía infantil en 2 semanas en CEM HHHA
- Acudir a urgencias en caso de signos de alarma (Dolor intenso que no cede con analgesia, fiebre persistente, vómitos o diarrea intensos)

MEDICAMENTOS

- PARACETAMOL CM 500 MG, 2/8hrs [por 3 días]

