

M.E.A.P.

CENTRO CENTRO DE SALUD FAMILIAR LAS COMPAÑIAS

ID13963731

16/05/2023

08:45:16

Paciente: LOPEZ TABILLO, MARIA JESUS IGNACIA(NHC 22608555-6)
Profesional: KESTERNICH PEREZ, CRISTIAN(RUT 16430920-7)

Motivo**Morbilidad****Anamnesis**

Antecedentes Mórbidos: Niega
Alergia a Medicamentos: Niega

Cuadro que inicia con fecha 13/05/2023, caracterizado por tos no productiva, odinofagia, cefalea, congestión nasal con rinorrea, mialgias, vómitos sin elementos patológicos en relación con la tos, diarrea acuosa sin elementos patológicos, sensación febril no cuantificada.
Niega Anosmia, Niega Ageusia

Exploración

- Sin aspecto tóxico
- Buen estado general, Vigil, GSW 15, cooperadora
- Piel y mucosas: Bien hidratadas y perfundidas, anictérica, sin exantema
- Nariz: Mucosa congestiva. Rinorrea serosa
- Faringe: Mucosa congestiva. Descarga posterior (-). Tonsillas sin lesiones ni alteraciones Placas de pus (-)
- Tórax simétrico, sin uso de musculatura accesoria.
- Cardíaco: Ruidos cardiacos regulares en 2 tiempos, no ausculto soplos
- Respiratorio: MP presente en ambos campos pulmonares. Sibilancias bilaterales y roncus
- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. RHA ligeramente aumentados. Sonoridad conservada. Sin signos de irritación peritoneal.

Diagnósticos

Diagnósticos: BRONQUITIS AGUDA

Actuación

Reposes en domicilio desde 15/05/2023 hasta 19/05/2023

- Uso obligatorio de mascarilla
- Observar evolución
- Agua abundante
- Alimentación según tolerancia
- Evitar sobreabrigos
- Ventilar la casa, evitar exposición a humo de tabaco o leña, taparse la boca y nariz al estornudar o toser (con antebrazo o pañuelo desechable)
- Lavado de manos con agua y jabón (dorsos, palmas, pliegues interdigitales, muñecas) SOS (especialmente al contacto con secreciones de la nariz o boca)
- Control de temperatura axilar cada 8 hr
- Prednisona 20 mg: 1 comprimido cada 12 horas por 5 días
- Salbutamol 100 mcg: 2 puff cada 6 horas por 5 días
- Paracetamol 500 mg: 2 comprimidos SOS en caso de dolor o fiebre (temperatura >37.8°C)
- Domperidona 10 mg: 1 comprimido antes de las 3 comidas principales x 2 días
- Control SOS