

H(+) Gā ETA x manjcos (2x(-))

CTA. CTE. : 10715957

DATOS ATENCION DE URGENCIA

No DE DAU : 77883

HOSPITAL LA SERENA

CALIDAD : ORIGINALADMISOR : moliva:f

CP : 531372

EMERGENCIA INFANTIL

CO-14

HC : 721709

5/2

NOMBRE : HIDALGO EGA A AILYN SOLEDAD

R.U.T. : 23.954.459-2

EDAD : 13a05m05d

FN : 22/05/2012

DIRECCION : AP HUERTO 61 PAMPA BAJA

TELEFONO : 964802888

SEXO : FEMENINO

PREVISION : FONASA C

CARACTER PREVISIONAL : PROVISORIA

COMUNA : 04101 LA SERENA

FEC.INGRESO : 27/10/2025 09:10

FECHA SUCEO : 27/10/2025 09:10

FORMA PAGO : FONASA C

MOT. CONSULTA : ENFERMEDAD

MEDIO LLEGADA : VEHICULO PARTICULAR

LUGAR SUCEO :

INSCRITO : S

PREMATURO

CARDIOPATA

SBOR

DIABETES

PESO

50 kg, 154 cm

DISPLASIA BP

NEFROPATA

ASMA

EPILEPSIA

PERTINENCIA SI - NO

Tratamiento :

COMENTARIO : DOLOR PARTE SUPERIOR DEL ESTOMAGO

SELECTOR : JCM

HORA : 09:34

CATEGORIA : C4

FIRMA :

HORA

FE

PA

175/74(87) (-)

PAT 02

TEND. ax

36,1°C

EVA

3/10

GLASGOW

A

HGT

(-) 92 mg/dl.

HORA ATENCION MEDICA : 10:35

ANNESES :

Resiste que hay deprimido con dolor abdominal, sin vómitos ni fiebre

EXAMEN FISICO :

Leve eufórico, RR2T, HR20 no agitados - BP 122/1, HR20, no agitados - Abdomen: Blando, laxo, sin dolor a la palpación profunda en el epigastrio - Vena umbilical: Gloriosa

HIPOTESIS DIAGNOSTICA :

HORA DEFINICION MEDICA : 10:40

HORA / TTD.ADM / ATENCION ENFERMERIA

INDICACIONES :

Rx de abdomen : Miosil a RX

① Dolor abdominal 350 Sohe => Dar 1 Sohe cada 12 hrs por 2 días, luego 1 vez al día por 3 días

TIPO PROFESIONAL

DESTINO

COND. EGRESO

PRONOSTICO

ALCOHOLEMIA

1 Medico

1 Cerv. Clínico

1 Leve

1 Sin Pronostico

SI - NO

2 Enfermera

2 Deneg. Clin.

2 Grave

2 Grave

3 TPM

3 Otra Establ.

3 Muy grave

3 Mediana grave

Hora Egreso

4 Alumno

4 Establ. Orig.

4 Inconciente

4 Leve

5 Matrona

5 Anat. Patolog.

5 Fallecido

DRA. YXORA VACARO

25.566.673-8

MÉDICO PEDIATRA

6 Odontologo

6 Med. Legal

6 Embarazada

7 Dep. Cadaveres

7 Sano

② Omepra 30 20 mg => Dar 1 capsula en ayunas una vez al día por 10 días

③ Traer en caso de vómitos, fiebre o empeoramiento