

**Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAPU-El Palqui**  
**Dirección: Pedro León Gallo s/n**

Dato de Atención de Urgencia

SAPU  
 Municipalidad De Monte Patria

Dato Nº :  
 Fecha Admisión:  
 Hora Admisión:

108349  
 15/10/2025  
 23:15:00

Centro Paciente: **CONSULTORIO EL PALQUI**Nombre: **TAPIA CASTILLO VICTORIA PAZ FERNAND**

R.U.N.: 22704840-9

Edad: 17 años 5 meses 20 dias

Domicilio: **ANDRES BELLO 067 EL PALQUI**

Fecha nac.: 25/04/2008

Teléfono: **Sexo: MUJER**

Previsión: FONASA GPO-B

País de Nacimiento: **Nacionalidad:**

Pertenece a un Pueblo Indígena: No

Hora Entrada Box: 23:16:16

Recepcionado por: **GUERRERO GUTIERREZ, OSCAR MAURICIO**Acompañante: **MAMA**

Motivo Administrativo:

**DOLOR ABDOMINAL nausea**

Motivo de consulta:

Tipo de Accidente:

Lugar Accidente:

ALERGICO: **NO**Categorización: **NO REGISTRA**

SIGNS VITIALES	HORA	PESO (KG) (grs)	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)	TEMP. RECTAL (°C)	T. AXILAR (°C)	FRECUENCIA CARDIACA (Lpm)	SAT. O2 (%)	FREC. RESP. (Respiraciones/ Minuto)	GLICEMIA CAPILAR (mg/dl)
	23:16:54		126	91	102.67	36.0	105	97	18	

Hipótesis Diagnóstica:

MIALGIA

Procedimientos:

**NO SE REGISTRARON.**

Medicamentos:

**NO SE REGISTRARON.**

Pronóstico Med. Legal: LEVE

Diagnóstico Principal:

MIALGIA (28313805-4 - ADRIANA NATHALI PEÑA MORA) - (Fecha: 15/10/2025) - (Hora: 23:53:23)

Indicaciones:

MC: dolor de estomago y nausea.

EA: adolescente femenino de 17 años de edad es traída por su madre por clínica de 5 días de evolución caracterizado por dolor abdominal de moderada intensidad en F1 y FII acompañada de 1 vomito bilioso y nausea, asociado de mialgia generalizada. niega fiebre, síntomas respiratorios, diarrea, síntomas urinarios irritativos.

Am: niega

Alergia: niega

QX: apendicectomia

EF:

BCG, afebril, tolera vía oral, hidratada.

RR2TS MP + SA

Abdomen: blando, depresible, doloroso en marco colónico predominando en FII, ruidos hidroaéreos presentes. palpo masa blanda de 3 cm aprox en FII, no adherida a planos profundos.

se realiza urotest con sangre +  
test de embarazo NEGATIVO

PLAN:

Reposo en casa por 3 días

régimen liviano

mantener buena hidratación

solicito ecografía abdomino-pelvica control por morbilidad

ibuprofeno 400mg 1 comp cada 8 horas por 5 días

Metoclopramida 10mg 1 comp cada 12 horas por 3 días

acudir a urgencia si estima necesario

se administra metamizol + metoclopramida IM